

ANEXO 3.06 F - CLASSIFICAÇÃO DOS PONTOS PARA ANÁLISE INTERTEMÁTICA - AVES

Nº DO PONTO	NOME DO PONTO	SÍTIO	RELEVÂNCIA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO ²	NÚMERO DE ESPÉCIES		ESPÉCIE DE MAIOR IMPORTÂNCIA REGISTRADA
					TOTAL	RESTRITAS	
RPS01P01	Poço do Veado	Norte	grande	regular	103	13	maracanã-nobre (<i>Diopsittaca nobilis</i>), jandaia-de-testa-vermelha (<i>Aratinga auricapilla</i>), papagaio-verdadeiro (<i>Amazona aestiva</i>), bacurau-da-telha (<i>Caprimulgus longirostris</i>) e tucanuçu (<i>Ramphastos toco</i>)
RPS01P08	Sete Lagoas						
RPS01P14	Prainha / camping						
RPS01P09	Lapa do Crescêncio	Norte	grande	ótimo	47	5	saracura-sanã (<i>Rallus nigricans</i>), maracanã-nobre (<i>Diopsittaca nobilis</i>), bacurau-da-telha (<i>Caprimulgus longirostris</i>), tucanuçu (<i>Ramphastos toco</i>) e pica-pau-chorão (<i>Picoides mixtus</i>)
RPS01P10	Lapa do Tatu						
OP R1	Casa de hóspedes	Norte	média	ruim	50	2	maracanã-nobre (<i>Diopsittaca nobilis</i>), jandaia-de-testa-vermelha (<i>Aratinga auricapilla</i>) e papagaio-verdadeiro (<i>Amazona aestiva</i>)
OP R2	Vila Santo Antônio	Norte	pequena	péssimo	28	8	(nenhuma)
RPS02P02	Caminho da Cachoeira do Crioulo	Central	Máxima	regular	72	5	águia-chilena (<i>Geranoaetus melanoleucus</i>), maracanã-nobre (<i>Diopsittaca nobilis</i>), jandaia-de-testa-vermelha (<i>Aratinga auricapilla</i>), asa-de-sabre (<i>Campylopterus largipennis</i>), matracão (<i>Batara cinerea</i>), cigarra-do-campo (<i>Neothraupis fasciata</i>), capacetinho-do-oco-do-pau (<i>Poospiza cinerea</i>), rabo-mole-da-serra (<i>Embernagra longicauda</i>) e campainha-azul (<i>Porphyrospiza caerulescens</i>)
RPS02P03	Cachoeira do Crioulo						
RPS02P04	Cachoeira das Sempre-vivas						
RPS02P05	Forquilha						
RPS02P07	Margem direita Cachoeira dos Crioulos						
RPS02P06	Córrego das Éguas / Rio Preto	Central	Média	ruim	22	3	(nenhuma)
RPS02P11	Limite com Faz. Rodrigues	Central	Grande	regular	56	2	maracanã-nobre (<i>Diopsittaca nobilis</i>), jandaia-de-testa-vermelha (<i>Aratinga auricapilla</i>), asa-de-sabre (<i>Campylopterus largipennis</i>), topetinho-vermelho (<i>Lophornis magnifica</i>), beija-flor-de-gravata-verde (<i>Augastes scutatus</i>), matracão (<i>Batara cinerea</i>) e papa-moscas-de-costas-cinzentas (<i>Polystictus superciliaris</i>)
OP R3	Taiobal	Central	média	ruim	27	0	jandaia-de-testa-vermelha (<i>Aratinga auricapilla</i>)
OP R4	Mata do Isidoro	Central	máxima	-	1	1	araponga (<i>Procnias nudicollis</i>)

Nº DO PONTO	NOME DO PONTO	SÍTIO	RELEVÂNCIA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO ²	NÚMERO DE ESPÉCIES		ESPÉCIE DE MAIOR IMPORTÂNCIA REGISTRADA
					TOTAL	RESTRITAS	
RPS03P 12	Morro Redondo	Sul	máxima	péssimo	98	18	urubu-rei (<i>Sarcoramphus papa</i>), águia-chilena (<i>Geranoaetus melanoleucus</i>), bacurau-da-telha (<i>Caprimulgus longirostris</i>), beija-flor-de-gravata-verde (<i>Augastes scutatus</i>), <i>Scytalopus</i> sp. nov., matracão (<i>Batara cinerea</i>), lenheiro-da-serra-do-cipó (<i>Asthenes luizae</i>), papa-moscas-de-costas-cinzentas (<i>Polystictus superciliaris</i>), caminheiro-de-barriga-acanelada (<i>Anthus hellmayri</i>), bandoleta (<i>Cypsnagra hirundinacea</i>), rabo-mole-da-serra (<i>Embernagra longicauda</i>), patativa-verdadeira (<i>Sporophila plumbea</i>), tico-tico-do-campo (<i>Coryphas piza melanotis</i>) e chopim-do-brejo (<i>Pseudoleistes guirahuro</i>)
RPS03P 13	Lapa do Anísio						
OP R5	Chapada, fora do PERP	Sul	máxima	péssimo	14	0	urubu-rei (<i>Sarcoramphus papa</i>), águia-chilena (<i>Geranoaetus melanoleucus</i>), beija-flor-de-gravata-verde (<i>Augastes scutatus</i>), <i>Scytalopus</i> sp. nov. e lenheiro-da-serra-do-cipó (<i>Asthenes luizae</i>)

¹ Categorização considerada para a relevância: máxima, grande, média, pequena e irrelevante.

² Estado de conservação: 1- excelente, 2- ótimo, 3- regular, 4- ruim e 5- péssimo.